

Aus der Universitäts-Augenklinik zu Giessen.

---

**DAS MYOPIEMATERIAL  
DER GIESSENER AUGENKLINIK  
IN DEN JAHREN 1879—1905.**

---

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen medizinischen Fakultät

der

Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen

vorgelegt von

**HEINRICH ANKELE**

aus Steinberg i. H.

---

Mit 4 Tafeln.

---

Giessen 1906.

von Münchow'sche Hof- und Universitäts-Druckerei (O. Kindt).



Aus der Universitäts-Augenklinik zu Giessen.

---

**DAS MYOPIEMATERIAL  
DER GIESSENER AUGENKLINIK  
IN DEN JAHREN 1879—1905.**

---

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

hohen medizinischen Fakultät

der

Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen

vorgelegt von

**HEINRICH ANKELE**

aus Steinberg i. H.

---

Mit 4 Tafeln.

---

Giessen 1906.

von Münchow'sche Hof- und Universitäts-Druckerei (O. Kindt).

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät.

Referent: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Vossius.

MEINEN LIEBEN ELTERN  
IN DANKBARKEIT

GEWIDMET.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Statistische Untersuchungen über eine Krankheitsform dürfen nur dann einen wirklichen und bleibenden Wert beanspruchen, wenn sie über Art und Verbreitung der betreffenden Krankheit brauchbare Aufschlüsse gewähren. Daß ein solcher Wert den überaus zahlreichen Statistiken über die Myopie noch nicht in vollkommenem Maße zugesprochen werden darf, ist mancherlei Gründen zuzuschreiben. Ausgehend oder beeinflusst von der jeweils geltenden Theorie über die Entstehung der Myopie wurde in den Arbeiten bald diese bald jene Seite dieser Refraktionsanomalie behandelt. Abgesehen von den verschiedenartigsten Einteilungsprinzipien beschäftigten sich viele Autoren nur mit einzelnen Bevölkerungsklassen oder mit einem bestimmten Lebensalter; andere berücksichtigten wiederum mehr lokale, territoriale, soziale und kulturelle Verhältnisse.

Die Aufzählung dieser die Zusammenstellungen leitenden Gesichtspunkte läßt uns schon die Schwierigkeit einer allumfassenden, einheitlichen Statistik erkennen und als Grundlage für eine solche die Behandlung des Stoffes in allseitiger und völlig erschöpfender Weise erfordern.

Daß bei den geschilderten Verhältnissen die einzelnen Autoren in vielen Punkten nicht untereinander übereinstimmen, ist so erklärlich und leicht verständlich. Wegen der bestehenden Meinungsverschiedenheiten und der oft verschiedene Erklärungsmöglichkeiten zulassenden Auslegung der Myopiestatistiken den Wert derselben als ganz illusorisch hinzustellen, wie es von einigen Seiten geschehen ist, hieße aber doch das Kind mit dem Bade ausschütten.

Ehe ich mich meiner Aufgabe, einen statistischen Beitrag über das Gießener Material unter erweiterten Gesichtspunkten zu liefern, zuwende, möchte ich vorher in

kurzen Worten die jetzt geltenden Theorien über das Wesen der Myopie streifen, soweit sie unser Thema tangieren, da im Verlauf meiner Arbeit bei der Erklärung der Ergebnisse ein Eingehen und eine Stellungnahme zu ihnen unerlässlich ist und ferner auch die Einteilung mancher Tabellen direkt durch sie veranlaßt wird.

Der Ausgangspunkt für alle Theorien beruht in der Frage, ob und inwiefern die intensive, andauernde Naharbeit die Ursache für das Entstehen der Kurzsichtigkeit bildet, und ob die sogenannten „hochgradigen“ Formen der Myopie, die in mannigfacher Weise Verschiedenartigkeiten von den leichtgradigen aufweisen, ebenfalls Beziehungen zur Naharbeit haben:

1. Die Donders'sche Theorie, daß die Naharbeit auch die Progression der Myopie bis zu den höchsten Graden bewirke, ist heute von der Mehrzahl der Autoren verlassen, welche statistisch den Nachweis erbracht haben, daß der größte Teil aller hochgradig Kurzsichtigen keine länger dauernde Naharbeit ausübten.

2. Die Stilling'sche Theorie: Die Myopie ist im wesentlichen vom Orbitalbau abhängig. Bei einer zu niedrigen Orbita kommt es zu deformierenden Druckwirkungen auf den noch wachsenden Bulbus durch die sich bei der Naharbeit kontrahierenden äußeren Augenmuskeln, hauptsächlich durch den Obliquus superior. So kann auch nicht die Schule diese Art der Myopie verhüten; sich darauf richtende schulhygienische Bestrebungen sind fruchtlos. Diese durch die Anlage vorbereitete und durch die Naharbeit ausgelöste „Arbeitsmyopie“ ist verschieden von der deletären Myopie, bei der im krankhaften Auge hydropische Veränderungen vor sich gehen. („Hydrophthalmie“.)

3. Andere Theorien, wie die Accommodations- und Convergenstheorie u. a., sind hier für uns nicht von Interesse.

Um zu einem definitiven und abschließenden Urteil über eine Frage von so eminenter Wichtigkeit zu gelangen

und um ein völlig zutreffendes Bild der Verbreitung der Myopie zu gewinnen, ist eine große Zahl von Beobachtungsreihen nötig, die an verschiedenen Orten zwecks Ausgleichs der durch lokale Verhältnisse entstehenden Schattierungen aufgestellt, über viele Jahre fortgeführt, zu einem Gesamtergebnis und -vergleich zusammengefügt werden müssen.

In dieser Richtung soll auch vorliegende Arbeit einen Beitrag liefern, welche die Fortsetzung darstellt einer Statistik Ott'es, der in seiner Inauguraldissertation „Klinisch-statistische Beiträge zur Lehre von der Kurzsichtigkeit“ sämtliche, in den Jahren 1879—1899 beobachteten Myopiefälle des poliklinischen Materials der ophthalmologischen Klinik zu Gießen einer vergleichenden Zusammenstellung unterzogen hat.

Auf Anregung von Herrn Geh. Med.-Rat Professor Dr. Voßius habe ich aus den Jahrbüchern der ophthalmologischen Klinik für den Zeitraum von 1899—1905 inkl. alle Fälle von Myopie gesammelt und der folgenden statistischen Betrachtung zu Grunde gelegt.

In der Art der Aufstellung der Tabellen und in ihrer Einteilung bin ich im wesentlichen dem Beispiele Ott'es zum Zweck einer einheitlichen Gesamtverwertung des Gießener Myopiematerials gefolgt.

An dieser Stelle näher auf die Arbeit Ott'es einzugehen, erübrigt sich, da ich dort, wo es nötig ist, stets das von ihm gefundene Resultat mit dem meinigen vergleichen und zum Schluß wieder das Gesamtergebnis beider Arbeiten einer allgemeinen Betrachtung unterwerfen werde.

In den Jahren 1899—1905 inkl. begaben sich 2162 Kurzsichtige in Behandlung der Gießener Klinik. Patienten, die mehrmals zur Untersuchung kamen, sind in der Uebersicht nur einmal berücksichtigt worden. Immerhin ist es möglich, daß hier und da ein Fall doppelt aufgezählt wurde, was aber bei einem großen Material, wo auch schon in

der Registrierung manch Fehler unterlaufen kann, nicht zu vermeiden ist.

Um für die Statistik nur Fälle einfacher und ätiologisch reiner Myopie zu verwenden, wurden in Abzug gebracht:

1. 98 Fälle von Anisometropie. Hiervon hatten:
  - a) 62 Myopie auf dem einen, Emmetropie auf dem andern Auge.
  - b) 36 Hypermetropie auf dem einen und Myopie auf dem andern Auge.
2. 32 Fälle mit Myopie auf dem einen Auge und wegen Komplikation (vorgeführter Katarakt etc.) nicht bestimmbare Refraktion auf dem andern Auge.
3. 263 Fälle von Myopie, die mit unregelmäßigem Astigmatismus verbunden war.
4. 121 Fälle mit großer Myopie-Differenz auf beiden Augen.
5. 12 Fälle, die in den poliklinischen Jahrbüchern als „excessive“ Myopie bezeichnet waren und aus manchen Gründen nicht genauer bestimmt werden konnten.

Darin, daß ich Kranke mit großer Myopiedifferenz auf beiden Augen aus der Statistik ausschalte, weiche ich von Otte ab, der diese Fälle zu den leichteren unter 5 Dioptrien gerechnet hat. Wo die Differenz eine geringe war, habe auch ich den Mittelwert gewählt und die Fälle unter diesem in der Statistik verrechnet. Mit einberechnet wurden ferner alle Fälle mit einfach myopischem Astigmatismus. Ob dies auch von Otte geschehen ist, weiß ich nicht, da sich in seiner Arbeit keine Angabe darüber findet.

Für unsere Zusammenstellung bleiben also nach Abzug obengenannter 526 Fälle 1636 Personen mit einfacher Myopie, die ausschließlich in den folgenden Untersuchungen berücksichtigt wurden.

Hiervon fielen auf das männliche Geschlecht 1287 = 78,67 %, auf das weibliche Geschlecht 349 = 21,34 %. Was in allen Statistiken erwiesen wurde, zeigt sich auch hier,

nämlich ein auffallend großes Überwiegen der männlichen Myopen. Für die Gießener Klinik, in der Studenten, Schüler höherer Lehranstalten, Präparanden und Seminaristen die Poliklinik sehr häufig wegen Refraktionsanomalien in Anspruch nehmen, ist der männliche Prozentfuß noch etwas höher als an anderen Orten, wo eine derartige, leicht einseitige Beeinflussung des Materials nicht statthat.

Aber auch nach Abrechnung der hierdurch bedingten Steigerung wird auf männlicher Seite immer noch ein bedeutendes Plus bleiben, das nicht als Zufälligkeit zu betrachten und dessen Erklärung nicht ganz einfach und erschöpfend zu geben ist, z. T. zur Zeit auch noch etwas hypothetisch bleibt. Daß der mehr im Kampf ums Dasein stehende Mann seine beste Waffe, das Auge, größeren Gefahren aussetzt, sich aber auch die Sorge um dasselbe mehr angelegen sein läßt als das Weib, darf als ein wichtiger und unbestrittener Grund angesehen werden.

Suchen wir nunmehr einen Überblick zu gewinnen, wieviel Kurzsichtige nach dem Geschlecht geordnet auf die Gesamtzahl aller von der Poliklinik in den Jahren 1899 bis 1905 behandelten Augenkranken prozentual fallen.

Von den 26 500 Patienten, die während der Jahre 1899—1905 die Poliklinik aufsuchten, waren 6,17<sup>0</sup>/<sub>100</sub> myopisch.

Von allen augenkranken Männern, etwa 17 500 an der Zahl, waren 1287 = 7,35<sup>0</sup>/<sub>100</sub> myopisch.

Von allen Frauen, deren Zahl rund 9000 beträgt, waren 349 = 3,88<sup>0</sup>/<sub>100</sub> myopisch. Wie sich das Prozentverhältnis nach dem Geschlecht getrennt, für die einzelnen Altersstufen gestaltet, ist aus der Tabelle I zu ersehen. Als erste Stufe habe ich die Zeit vom 1. bis 14. Lebensjahr gewählt, weil während dieser Zeit an die Augen der meisten Menschen die größten und für alle ziemlich die gleichen Anforderungen gestellt werden. Die nächste Gruppe bildet das Lebensalter von 15—30 Jahren. Die folgenden Gruppen sind dekadenweise angeordnet.

Tabelle I.

| Alter                   | bis<br>14 Jahren | 15—30 | 31—40 | 41 u. mehr |
|-------------------------|------------------|-------|-------|------------|
| Männer                  | 1,01%            | 5,22% | 0,48% | 0,64%      |
| Weiber                  | 1,02%            | 1,53% | 0,58% | 0,74%      |
| Durchschnitts-<br>summe | 1,01%            | 3,97% | 0,51% | 0,68%      |

Wir ersehen aus der Tabelle, daß sich im 15.—30. Lebensjahr die meisten Kurzichtigen unter allen Augenkranken befinden, nämlich 3,97%, und daß von diesen wiederum der größte Teil dem männlichen Geschlechte zufällt.

In den folgenden Tabellen ist unser Myopiematerial

Tabelle II beleuchtet die Myopie nach

| Diop-<br>trien    | 1      |        | 2      |        | 3      |        | 4      |        | 5      |        | 6      |        | 7      |        | 8      |        | 9      |        | 10     |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Alter             | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. |
| 5—10<br>Jahre     | 4      | 6      | 12     | 9      | 8      | 10     | 2      | 1      | 3      | 8      | 1      | 1      | 3      | 3      | 3      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 11—14<br>Jahre    | 28     | 3      | 34     | 10     | 25     | 13     | 19     | 7      | 11     | 5      | 1      | 1      | 1      | 1      | 3      | 1      |        | 2      | 4      | 1      |
| 15—20<br>Jahre    | 146    | 9      | 117    | 21     | 67     | 12     | 43     | 7      | 36     | 5      | 26     | 5      | 16     | 5      | 8      | 2      | 5      | 1      | 2      | 3      |
| 21—30<br>Jahre    | 93     | 9      | 91     | 14     | 74     | 11     | 53     | 3      | 32     | 4      | 31     | 1      | 16     | 2      | 12     | 3      | 8      | 4      | 8      | 5      |
| 31—40<br>Jahre    | 16     | 6      | 19     | 7      | 21     | 5      | 8      | 5      | 5      | 4      | 1      | 6      | 2      | 3      |        | 1      | 3      | 2      | 5      | 5      |
| 40 u. m.<br>Jahre | 19     | 6      | 19     | 7      | 20     | 5      | 13     | 3      | 6      | 3      | 4      | 6      | 2      | 7      | 5      | 7      | 3      |        | 5      | 4      |
|                   | 306    | 39     | 292    | 68     | 215    | 56     | 138    | 26     | 93     | 29     | 68     | 20     | 40     | 21     | 31     | 15     | 20     | 10     | 25     | 1      |
|                   | 345    |        | 360    |        | 271    |        | 164    |        | 122    |        | 88     |        | 61     |        | 46     |        | 30     |        | 44     |        |

derart gegliedert und gesichtet, daß die Einteilung erfolgt nach dem Geschlecht, Alter, Beruf und der damit in Zusammenhang stehenden Beschäftigungsart, dem Grade der Kurzsichtigkeit und den hauptsächlichsten bei Myopie sich findenden Augenhintergrundsveränderungen.

In der Tabelle II haben wir alle Fälle geordnet nach verschiedenen Altersstufen, Geschlecht und Dioptrien. Wie in dem von Otte bearbeiteten Material fanden sich auch in dem meinigen myopische Kinder unter 5 Jahren nicht vor, so daß in der Tabelle das 5. Lebensjahr als unterste Grenze aufgeführt ist. Die nächste Altersgruppe geht vom 11.—14. Jahre, weil bei dem größten Teil der Patienten die Schulbildung mit dem 14. Jahre abschließt.

trien, Lebensalter und Geschlecht.

|   | 12     |        | 13     |        | 14     |        | 16     |        | 18     |        | 20     |        | 22     |        | 24     |        | 26 und mehr |        | männl. | weibl. |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
|   | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl.      | weibl. |        |        |
| 2 |        | 1      |        | 1      |        |        | 1      |        | 1      |        |        |        |        |        |        |        |             |        | 41     | 45     |
|   | 1      |        |        | 2      | 3      |        | 1      |        |        |        | 1      |        |        |        |        |        |             |        | 135    | 47     |
| 1 | 1      | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      | 4      |        |        |        | 2      |        |        |        | 1      | 1      |             | 1      | 479    | 76     |
| 2 | 5      | 1      | 2      |        | 3      |        | 4      |        | 1      | 2      |        | 1      |        |        |        |        |             |        | 435    | 62     |
| 2 | 2      |        |        | 2      |        | 3      |        |        |        |        |        | 1      |        |        |        |        |             |        | 84     | 52     |
| 2 | 2      |        | 3      |        |        | 2      | 3      | 7      | 2      | 3      | 3      | 4      |        |        |        | 1      |             |        | 113    | 67     |
| 9 | 10     | 4      | 7      | 6      | 8      | 6      | 13     | 7      | 4      | 5      | 5      | 7      |        |        | 1      | 2      |             | 1      | 1287   | 349    |
| 9 | 14     |        | 13     |        | 14     |        | 20     |        | 9      |        | 12     |        |        |        | 3      |        | 1           |        | 1636   |        |

Auch unsere Tabelle läßt wie die von Otte und den meisten seiner Vorgänger aufgestellte ein umgekehrtes Verhältnis zwischen dem Grad der Myopie und der Anzahl der Fälle erkennen, oder mit anderen Worten ausgedrückt, es nimmt mit dem Wachsen des Kurzsichtigkeitsgrades die absolute Zahl der Myopen ab bei den Männern sowohl wie bei den Frauen. Ferner lehrt uns die Zusammenstellung, daß mit dem Alter die Myopie zunimmt; die Zunahme erstreckt sich jedoch nicht in gleichmäßig aufsteigender Linie bis in das hohe Alter hinein, sondern sie findet schon verhältnismäßig frühzeitig einen Abschluß etwa mit dem 30. Lebensjahre.

Es kamen zur Untersuchung 1042 Kurzsichtige im Alter von 15–30 Jahren und nur 316 im Alter über 30 Jahre. Wenn wir dieses Verhältnis in einer Kurve zum Ausdruck bringen wollten, deren aufsteigender Schenkel seinen Höhepunkt mit dem 30. Jahre erreicht, so müßte

Tabelle III. Prozentverhältnis der Myopie nach

| Dioptrien | 1     | 2     | 3     | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Männer    | 23,78 | 22,66 | 16,72 | 10,71 | 7,23 | 5,28 | 3,11 | 2,40 | 1,55 | 1,93 |
| Weiber    | 11,18 | 19,48 | 16,05 | 7,45  | 8,31 | 5,73 | 6,02 | 4,30 | 2,87 | 5,44 |

nach dem Ergebnis der Tabelle die Kurve bei dem 15. Lebensjahr einen steilen Anstieg erfahren, da gerade hier eine erhebliche Zunahme der Myopiekrankenzahl einsetzt. An dieser Stelle muß ich ebenso wie Otte die durch zahlreiche Schüler, Studenten etc. etwas einseitig beeinflusste Zusammenfassung unseres Materials erwähnen, sie hat aber das Resultat nicht wesentlich geändert, da die an anderen Orten aufgestellten Statistiken das gleiche Ergebnis aufweisen. Daß das Steigen des Myopiegrades und das Fallen der Anzahl der Myopiefälle in den

einzelnen Rubriken nicht ganz gleichmäßig verläuft, ist wohl nur Zufall.

Die Betrachtung der letzten Vertikalreihe der Tabelle, welche nach den beiden Geschlechtern getrennt die Summen für die einzelnen Jahrgänge enthält, ergibt eine Kurve mit aufsteigendem und abfallendem Schenkel deren Höhepunkt in den 2 Gruppen 15—20 und 21—30 Jahren gelegen ist.

Die geschilderten Verhältnisse gelten nur für die Summe der Myopiekranken, also für Männer und Frauen; ein anderer Gesichtspunkt wird sich aus der Statistik ergeben, wenn wir eine Sonderung nach den Geschlechtern vornehmen. Die Beteiligungsziffer der beiden Geschlechter an den einzelnen Myopiegraden läßt sich besser als an den absoluten Zahlen erkennen, wenn man die Prozentzahl im Verhältnis zur Gesamtsumme der Myopen sich vor Augen führt, wie es in Tabelle III geschehen ist.

Dioptrien bei Männern und Frauen.

Tabelle III.

| 11   | 12   | 13   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22 | 24   | 26 u.<br>mehr |   |
|------|------|------|------|------|------|------|----|------|---------------|---|
| 0,79 | 0,79 | 0,54 | 0,62 | 1,01 | 0,31 | 0,39 |    | 0,7  |               | % |
| 2,58 | 1,15 | 1,72 | 1,72 | 2,01 | 1,43 | 2,01 |    | 0,57 | 0,29          | % |

Man sieht hier, daß bis zur 5. Dioptrie die Zahl der Männer überwiegt, daß von da ab aber bis zu den höchsten Graden stets die Zahl der weiblichen Myopen nicht unbedeutend überlegen ist. Dieses Verhalten gelangt wohl noch besser als wie in Tabelle III zur Veranschaulichung, wenn man es in Kurvenform zum Ausdruck bringt, wie es in Kurve 1 geschehen ist, in der die in der Tabelle berechneten Prozentzahlen der Männer durch eine ausgezogene, die der Frauen durch eine punktierte Linie markiert sind. Wir bemerken hier bei den Frauen einen

Anstieg der Kurve von der 1. bis zur 2. Dioptrie, dann aber einen steilen Abfall gemeinsam mit der von Anfang an sinkenden Kurve der Männer, wobei diese aber immer um ein Geringes höher bleibt. Der gemeinsame, fast parallel verlaufende Abstieg reicht bis zur 5. Dioptrie, von wo ab dann die weibliche Kurve bis zu den höchsten Dioptriegraden die Oberhand gewinnt. Die Grenze, an der nach meiner Zusammenstellung das Uebergewicht der weiblichen Myopen einsetzt, beginnt also schon bei der 5. Dioptrie, während Otte und einige Autoren die 6., noch andere die 8.—10. Dioptrie als Grenzwert angeben. Wenn wir dieses Resultat in Beziehung bringen zu den geltenden Theorien, so würde die Kurzsichtigkeit bis zu 5—6 Dioptrien als Arbeitsmyopie aufzufassen sein, weil bis zu dieser Grenze das meist naharbeitende männliche Geschlecht das Uebergewicht hat.

Im Gegensatz zu der Arbeits- oder leichtgradigen Myopie wollen wir in folgendem die Fälle mit einer 5 D. übersteigenden Kurzsichtigkeit als hochgradige bezeichnen; dabei sind wir uns bewußt, diese Einteilung nicht willkürlich gewählt zu haben, indem wir mit vielen Autoren die über 5 bis 6 D. hinausgehenden Grade in den meisten Fällen als ätiologisch verschieden von den leichtgradigen auffassen.

Bei dieser Sonderung mit 5 D. als Grenze ergibt sich unter 1636 Myopen:

eine hochgradige Kurzsichtigkeit in 496 Fällen =  $30,32\%$   
eine leichtgradige Kurzsichtigkeit (unter 5 D.) in 1140  
Fällen =  $69,69\%$

Von den 1140 leichtgradigen Myopen waren:

männlichen Geschlechts 951 =  $83,42\%$

weiblichen Geschlechts 189 =  $16,58\%$ .

Die überwiegende Beteiligung des männlichen Geschlechts an der leichtgradigen Myopie tritt in meiner

Zusammenstellung noch in höherem Maße auf als wie in der Statistik Otte's, der ebenfalls seinen höheren Prozentsatz im Vergleich zu dem von anderen Autoren gefundenen mit dem großen Schüler- und Studentenmaterial der Gießener Klinik erklärt.

Von den 496 hochgradigen Myopen waren:

männlichen Geschlechts 335 = 67,54 %

weiblichen Geschlechts 161 = 32,46 %.

Von den gesamten 1286 männlichen Kurzsichtigen waren:

hochgradig myop 335 = 26,03 %.

Von den gesamten 350 weiblichen Kurzsichtigen waren:

hochgradig myop 161 = 46,13 %.

Die Frauen mit hochgradiger Kurzsichtigkeit übertrafen also die Männer um 20,1 % . Die schon vielfach aufgestellte Behauptung, daß an der hochgradigen Myopie das weibliche Geschlecht unverhältnismäßig häufiger beteiligt ist als das männliche, wird in meiner Statistik noch deutlicher offenbar als in der Otte's, der bei den Frauen nur ein Übergewicht von 7,78 % fand.

Unter den 26500 poliklinisch behandelten Augenkranken waren leichtgradig kurzsichtig 4,3 % und zwar

3,59 % Männer und 0,71 % Frauen,

hochgradig kurzsichtig 1,87 % und zwar

1,26 % Männer und 0,61 % Frauen.

Ein ähnliches Resultat haben auch andere Autoren nachgewiesen.

Um ein Bild zu gewinnen von dem Vorkommen der Myopie bei den beiden Geschlechtern während der einzelnen Altersstufen, gebe ich zur besseren Veranschaulichung die in der letzten Vertikalkolumne der Tabelle II angeführten Zahlen hier gesondert an:

| Altersklassen     | männlich | weiblich |
|-------------------|----------|----------|
| 5—10 Jahre        | 41       | 45       |
| 11—14 Jahre       | 135      | 47       |
| 15—20 Jahre       | 479      | 76       |
| 21—30 Jahre       | 435      | 62       |
| 31—40 Jahre       | 84       | 52       |
| 40 und mehr Jahre | 113      | 67       |

Wir finden bis zum Alter von 10 Jahren beim weiblichen Geschlecht eine größere Zahl von Myopen als beim männlichen.

Von den 41 männlichen Kindern waren :

leichtgradig (bis 5 D.) myopisch  $26 = 63,41\%$ ,

hochgradig (über 5 D.) myopisch  $15 = 36,59\%$ .

Von den 45 weiblichen Kindern waren :

leichtgradig myopisch  $26 = 57,78\%$ ,

hochgradig myopisch  $19 = 42,22\%$ .

Die Zusammenstellung zeigt, daß schon im frühesten Alter bis zu 10 Jahren das weibliche Geschlecht das männliche etwas an hochgradiger Kurzsichtigkeit übertrifft. Auffallend ist im Vergleich zum Ergebnis der Otte'schen Tabelle der hohe Prozentsatz stark myopischer Kinder im Alter bis zu 10 Jahren. Meiner Ansicht nach wird die Differenz wohl mit Zufälligkeiten in der Zusammenfügung des bearbeiteten Materials erklärt werden dürfen. Für die hochgradigen Myopiefälle bei den Kindern zwischen 5—10 Jahren kann weder die Naharbeit in der Schule in den ersten 4 hier in Betracht kommenden Schuljahren als Entstehungsursache bezeichnet werden, da in dieser Zeit mit Lesen und Schreiben noch nicht zu große Anforderungen

an die Kinder gestellt werden, noch kann sonst mißbräuchliche Augenanstrengung dafür verantwortlich gemacht werden.

Wie sich weiterhin in den folgenden Jahresklassen das Prozentverhältnis der beiden Geschlechter in Bezug auf die Gesamtzahl aller männlichen und weiblichen Myopen betreffs Vorkommens der Kurzsichtigkeit gestaltet, ist in der Tabelle IV zum Ausdruck gebracht und in der Kurventafel II graphisch dargestellt.

Tabelle IV.

| Alter                   | 5—10  | 11—14 | 15—20 | 21—30 | 31—40 | 41 und mehr |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|                         | %     | %     | %     | %     | %     | %           |
| Männer                  | 3,19  | 10,41 | 37,22 | 33,72 | 6,52  | 8,78        |
| Weiber                  | 12,89 | 13,47 | 21,77 | 17,77 | 14,90 | 19,20       |
| Durchschnitts-<br>summe | 5,26  | 11,12 | 33,31 | 30,80 | 8,31  | 11,00       |

Die Kurven der männlichen und weiblichen Myopen kreuzen sich zum erstenmal etwa beim 14. Lebensjahr; bis zu diesem Zeitpunkte hatte die weibliche Kurve die Führung. Dann geht die Führung auf die männlichen Myopen über, bei denen die Kurve in steilem Anstieg im 15.—20. Lebensjahr den Gipfelpunkt mit 37,22% erreicht; sie läßt die weibliche während dieses Zeitraumes um 15,45% hinter sich. Zum zweitenmal kreuzen sich die Kurven kurz nach dem 30. Lebensjahr, von wo ab die Kurve der Frauen stets höher bleibt als die der Männer. In der Erklärung dieses Verhaltens folgen wir der Auffassung der meisten Autoren, daß nach Abschluß der Schulzeit für den jungen Mann die die Augen affizierende Naharbeit nicht in Wegfall kommt, sondern im Gegenteil bei dem einen durch weitere wissenschaftliche Ausbildung, bei dem andern durch einen anstrengenden Naharbeitsberuf noch gesteigert wird, und daß gerade in

diesen Jahren schon im Interesse des sozialen Fortkommens der junge Mann sein wichtigstes Werkzeug, das Auge, oft ärztlicher Untersuchung unterwirft. Anders dagegen liegen die Verhältnisse bei dem größten Teil der Frauen, deren Augen nach der Schulzeit meist nicht mehr anstrengende Naharbeit verrichten.

Wenn wir ein allumfassendes, völlig zutreffendes Bild von der Verbreitung der Myopie, das auch in ätiologischer Hinsicht irgend welche Aufschlüsse zu geben vermag, gewinnen wollen, so müssen wir alle Volksschichten, alle Berufsklassen und die Art der Berufsbeschäftigung in den Kreis unserer Betrachtung ziehen und mit einander vergleichen. Erst hierdurch können wir erkennen, ob wirklich nur die Naharbeit allein die Schuld trägt an der Myopie und deren Fortschreiten beeinflusst und ob nicht noch eine tiefere Ursache für die Kurzsichtigkeit vorliegt.

Für das jugendliche Alter bis zu 14 Jahren hat eine Sonderung nach Bevölkerungsklassen keinen Zweck, da im wesentlichen an alle Kinder dieses Alters von der Schule die gleichen Anforderungen gestellt werden und bei allen die Naharbeit auch so ziemlich die gleiche ist.

Tabelle V.

Myopie bei den ver-

| Dioptrien                                                                      | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|
| Landleute, Gärtner, Förster etc. .                                             | 25  | 17  | 24 | 5  | 12 | 10 | 2  |
| Handwerker ohne Naharbeit, Bergleute, Händler, Tagelöhner . . .                | 12  | 13  | 5  | 7  | 3  | 1  | 3  |
| Schuster, Schneider, Uhrmacher, Techniker, Mechaniker, Schriftsetzer . . . . . | 33  | 30  | 30 | 19 | 15 | 11 | 4  |
| Schreiber, Musiker, Kaufleute, Maler, Forstbeamte . . . . .                    | 35  | 39  | 45 | 28 | 13 | 8  | 5  |
| Studierte, Studierende, Lehrer . .                                             | 180 | 153 | 80 | 69 | 38 | 35 | 20 |



Wir sehen in der letzten Vertikalpalte der Zusammenstellung zahlenmäßig ausgedrückt, wie weit die einzelnen Berufsklassen des Gießener Materials von der Myopie befallen sind. Die größte Beteiligung an der Myopie weist die 5. Gruppe auf, die wohl in allen, in Universitätskliniken aufgestellten Statistiken ein ähnliches Überwiegen darbietet. Die Kurzsichtigkeit ist also in hohem Maße unter den Vertretern gelehrter Stände verbreitet. Durch das etwas starke Hervortreten studierter Berufe in unserem Material werden aber die folgenden Erörterungen keineswegs einseitig beeinflusst; es steht daher einer Verallgemeinerung der Resultate keine Einschränkung im Wege.

Vergleichen wir nun den Myopiegrad der einzelnen Berufsklassen mit einander, so sehen wir die Vertreter der Gruppe I und II in nicht sehr hohem Maße von Kurzsichtigkeit mittleren Grades, verhältnismäßig oft aber wieder von hochgradiger Myopie befallen. Die Vertreter der IV., vor allem aber der V. Gruppe leiden dagegen häufig an geringer und mittlerer Kurzsichtigkeit, etwa bis zu 10.—11. D., während sich verhältnismäßig hochgradige Myopie nicht sehr häufig bei ihnen findet. Aus unserer Tabelle ergibt sich für die einzelnen Klassen folgende Durchschnittsmyopie:

| Beruf    | Durchschnittsmyopie in D. |
|----------|---------------------------|
| Gruppe I | 5,01 Dioptrien            |
| „ II     | 5,29 „                    |
| „ III    | 4,2 „                     |
| „ IV     | 3,75 „                    |
| „ V      | 3,06 „                    |

Hieraus erhellt, daß die Mehrzahl der mit hochgradiger Myopie behafteten Personen der I. und II. Gruppe angehören, also einer den niederen Klassen zuzählenden Bevölkerung, bei der eine angestrengte Naharbeit ziemlich

ausgeschlossen ist und auch nicht das Zustandekommen der Kurzsichtigkeit beeinflussen kann. Daß die Durchschnittsmyopie der II. Gruppe ziemlich bedeutend von dem Resultat Otte's abweicht, mag vielleicht darauf beruhen, daß in unseren Arbeiten nicht in gleich strenger Weise die für die beiden Gruppen aufgezählten Berufsarten auseinander gehalten und so Personen zur einen Gruppe gezählt wurden, die der anderen zukamen. Ohne einen wesentlichen Fehler zu begehen, können wir den weitaus größten Teil der I. und II. Gruppe als Landbevölkerung auffassen, da außer Gießen keine größeren Stadtgemeinden zur Lieferung unseres Krankenmaterials beitragen. Es würde dann der sich aus der Tabelle ergebende Satz auch so lauten können, daß hochgradige Kurzsichtigkeit überaus häufig in der Landbevölkerung des Gießener Materials verbreitet ist und daß für diese die Naharbeit in keiner Weise als urfächliches Moment der Myopie erklärt werden darf.

In der folgenden Tabelle (VI) wollen wir einen zahlenmäßigen Ausdruck über Vorkommen und Zusammenfallen von Naharbeit mit Myopie zu gewinnen suchen, wenn wir die 5 Gruppen in „Nicht-Naharbeiter“ und „Naharbeiter“ sondern. Zählen wir die Vertreter der Gruppe I und II als Nicht-Naharbeiter und die der Gruppe III, IV und V als Naharbeiter auf, so fallen unter die 1. Abteilung 181 Personen, unter die 2. Abteilung 963. Die hierbei sich zeigende Differenz zwischen Otte und mir, der mehr Nicht-Naharbeiter als Naharbeiter aufführt, findet darin ihre Erklärung, daß, wie ich mich bei Durchblätterung der von Otte bearbeiteten Jahrgänge überzeugte, in auffallend ausgedehnterem Maße in den letzten Jahren gegenüber den früheren Seminaristen, Schüler höherer Lehranstalten, Studenten und sonstige Vertreter studierter Berufe sich die Augen spezialistisch untersuchen ließen, selbst auch wenn keine bedeutendere Refraktionsanomalie vorlag. Die absoluten Zahlen der Tabelle VI sind in

der Kurventafel III im Prozentverhältnis zur Gesamtzahl der Naharbeiter durch die unterbrochene Linie, und Nicht-Naharbeiter durch die ausgezogene Linie gekennzeichnet.

Tabelle VI.

Myopie bei Nicht-Nah-

| Dioptrien                      | 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| Gruppe I und II . . . . .      | 37  | 30  | 29  | 13  | 15 | 11 | 5  |
| Gruppe III, IV und V . . . . . | 248 | 222 | 155 | 116 | 66 | 54 | 29 |

Wie in der Tabelle, so kommt auch jetzt in der Kurve der zwischen mir und Otte bestehende Gegensatz zum Ausdruck, indem nicht wie bei Otte die Kurve der Nicht-Naharbeiter, sondern die der Naharbeiter den steileren Abstieg aufweist, sodaß eine Myopie von nur 1 D. sich bei 25,75 % Naharbeitern und bei 20,4 % Nicht-Naharbeitern findet. Die Kurve der Naharbeiter bleibt dann bei den niedrigen Dioptriegraden immer über der Nicht-Naharbeiterkurve, bis sie bei etwa 7 D. unter diese fällt und außer einem geringen Überschreiten bei 11 D. stets unten bleibt. Der mittlere und letzte Teil der Kurventafel stimmt wieder mit der von Otte überein, sodaß wir auch darin ihm und seinen Vorgängern beipflichten können, daß hochgradige Myopie keineswegs nur durch angestrengte Naharbeit allein erzeugt wird und daß diese für die Entstehung der schlimmen Fälle jedenfalls gar nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Wenn ich mich im folgenden nunmehr den Komplikationen der Myopie zuwende, so möchte ich den Ausdruck „Komplikation“ nicht im weiteren Sinne gefaßt sehen, das heißt äußere, oft die Kurzsichtigkeit begleitende Augenerkrankungen, wie Hornhaut- und beginnende Linien- trübung u. a. sollen nicht berücksichtigt werden, sondern

nur die als Folge- und Begleitzustände oder die Myopie begünstigende Momente geltenden Augenhintergrundsveränderungen. Von den zahlreichen und vielgestalteten bei Myopie vorkommenden ophthalmoskopischen Befunden will ich nur

arbeitern und Naharbeitern.

Tabelle VI.

| 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 u.<br>mehr |     |
|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|-----|
| 7  | 7 | 4  | 1  | 6  | 2  | 4  | 7  | 1  | 2  | 1  |    |               | 181 |
| 20 | 9 | 15 | 9  | 5  | 4  | 2  | 5  | 1  | 3  |    |    |               | 963 |

die wichtigsten und häufigst beobachteten zusammenstellen und so in der Tabelle VII folgende verwerthen:

1. Glaskörpertrübungen, 2. Netzhautablösung, 3. Chorioiditis, 4. Conus resp. Staphyloma postikum, 5. Strabismus divergens, 6. Strabismus convergens.

Da sich uns auch hier wieder die Frage aufdrängt, ob mit den Komplikationen der Myopie die Naharbeit in irgend einem Zusammenhang steht, so haben wir in der Tabelle VII wiederum sämtliche Myopiekranken, Männer und Frauen nach Nah- und Nicht-Naharbeitern gesichtet, wobei die Frauen und Kinder zu den letzteren gerechnet wurden.

Eine Teilung nach dem Geschlecht mußte leider dabei wegen der schon an anderer Stelle erwähnten schwierigen weiblichen Berufseinteilung unterbleiben, so interessant auch ein statistischer Aufschluß über die Beteiligung der beiden Geschlechter an den Komplikationen in Bezug auf die Naharbeit wäre. In den Zusammenstellungen, wo die Frauen einfach im Gegensatz zu den Männern betr. Beteiligung an den Komplikationen ohne Bezugnahme auf die Naharbeit verrechnet wurden, stellte es sich heraus, daß das weibliche Geschlecht in bedeutend höherem Maße von Komplikationen betroffen war, wie das männliche.

Tabelle VII.

Komplikationen bei den Myopen des Gießener Materials.

| Dioptrien                             | 1—4               |             | 5—10              |             | 11—15             |             | 16—20             |             | 21 u.<br>mehr     |             | Summe             |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Art der<br>Komplikation.              | Nicht-Naharbeiter | Naharbeiter | Nicht-Naharbeiter | Naharbeiter | Nicht-Naharbeiter | Naharbeiter | Nicht-Naharbeiter | Naharbeiter | Nicht-Naharbeiter | Naharbeiter | Nicht-Naharbeiter | Naharbeiter |
| Glaskörpertrübungen                   | 21                | 3           | 14                | 4           | 7                 | 2           | 4                 |             | 1                 |             | 47                | 9           |
| Netzhautablösung                      | 3                 | 2           | 5                 | 2           | 4                 | 1           | 2                 |             |                   |             | 14                | 5           |
| Chorioiditis                          | 25                | 3           | 10                | 3           | 5                 | 1           | 2                 |             |                   |             | 42                | 7           |
| Chorioiditis mit Conus<br>(Staphylom) | 8                 | 2           | 9                 | 3           | 7                 | 1           | 7                 | 2           | 1                 |             | 32                | 8           |
| Conus (Staphylom<br>post.)            | 115               | 105         | 80                | 65          | 30                | 8           | 11                | 1           | 2                 | 1           | 238               | 180         |
| Strabismus div. Insuff.<br>d. intern. | 33                | 9           | 9                 | 3           | 3                 | 1           | 3                 |             |                   |             | 48                | 13          |
| Strabismus convergens                 | 3                 | 3           | 3                 |             |                   |             |                   |             |                   |             | 6                 | 3           |
|                                       | 208               | 127         | 130               | 80          | 56                | 14          | 29                | 3           | 4                 | 1           | 427               | 225         |
|                                       | 335               |             | 210               |             | 70                |             | 32                |             | 5                 |             | 652               |             |

Von unferen 1636 Myopiekranken waren 652 mit Komplikationen behaftet = 39,85  $\%$ . Von diesen 652 Komplikationen fiel der größte Teil nämlich 427 = 65,49  $\%$  den Nicht-Naharbeitern zu. Auf die Naharbeiter kamen 225 = 34,51  $\%$ . Es war also von all den kurzsichtigen Augen etwa  $\frac{1}{3}$  mit Augenhintergrundsveränderungen behaftet, die wiederum nur zu einem Drittel Naharbeit betreibenden Individuen angehörten. Wenn ich im einzelnen die Komplikationen der Häufigkeit ihres Vorkommens

nach geordnet, aufzähle, so steht an der Spitze der Konus oder das Staphyloma post. in 458 Fällen, wobei die mit Chorioiditis komplizierten 40 Fälle mit einberechnet sind. Auf alle Myopiefälle bezogen, fand sich der Konus in 27,99 %; auf alle Komplikationen bezogen, in 70,24 %.

Es folgen dann :

Strabismus div. in 61 Fällen ;

Glaskörpertrübungen in 56 Fällen ;

Chorioiditis in 49 Fällen ;

Netzhautablösung in 19 Fällen ;

Strabismus convergens in 9 Fällen.

Der Uebersicht halber füge ich noch Tabelle VIII hinzu, in der die absoluten Zahlen im Prozentverhältnis zu sämtlichen Myopie- und sämtlichen Komplikationsfällen gesetzt sind.

Tabelle VIII.

|                                                 | Glaskörper-<br>trübungen | Netzhaut-<br>ablösung | Chorioideal-<br>affektionen | Chorioiditis<br>mit Konus | Konus ohne<br>Chorioiditis | Strabismus<br>divergens | Strabismus<br>convergens |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| % sämtlicher Myopie-Fälle . . .                 | 3,42                     | 1,11                  | 2,99                        | 2,45                      | 25,55                      | 3,73                    | 0,55                     |
| % sämtlicher Fälle mit Komplikationen . . . . . | 8,59                     | 2,91                  | 7,52                        | 6,13                      | 64,11                      | 9,36                    | 1,38                     |

Aus den Zahlen unserer Tabelle dürfen wir wohl den Schluß ziehen, daß das Staphylom als die typische Komplikation der Myopie gelten kann. Soweit zu gehen wie viele Autoren, die infolge des von ihnen gefundenen, meist 50 % überschreitenden hohen Prozentsatzes einen engen ätiologischen Zusammenhang zwischen Staphylom und Myopie konstruierten, berechtigt uns das Ergebnis der Tabelle nicht, welches uns das Staphylom nur als häufige Begleiterscheinung der Myopie aufzufassen gestattet.

Zur besseren Uebersicht habe ich ebenso wie Otte eine Kurventafel (IV) beigelegt, welche darlegen soll, wie sich prozentual die Gesamtheit aller Komplikationen bei Nah- und Nicht-Naharbeitern auf die einzelnen Myopiegrade verteilt. Es sind zu diesem Zwecke die unter den 5 Dioptriekolumnen angegebenen Komplikationslumen in das Prozentverhältnis zu den bei Nah- und Nicht-Naharbeitern gefundenen Gesamtkomplikationen gesetzt. Die so resultierende Kurve entspricht im wesentlichen der von Otte aufgestellten. Was schon so viele statistische Arbeiten ergeben haben, tritt auch hier wieder zu Tage, daß bei der Myopie höheren Grades Komplikationen sich häufiger bei Nicht-Naharbeitern als bei Naharbeitern finden, während bei Myopie unter ca. 10 D. häufiger Naharbeiter von Komplikationen betroffen sind.

In der Kurventafel V möchte ich graphisch zum Ausdruck bringen, wieviel Prozent mit Komplikation behafteter Myopen auf die Gesamtzahl aller Kurzsichtigen bezogen, den einzelnen Dioptriegruppen zuzurechnen sind. Wir ersehen aus der Tafel, daß mit dem Wachsen des Dioptriegrades von 1—15 D. die Kurve in steiler Weise aufsteigt, daß sie in der Gruppe 11—15 D. ihren Höhepunkt erreicht mit 100  $\frac{0}{0}$ . Es sind darnach alle Augen zwischen 11—15 D. Myopie von Komplikationen betroffen. In den nächsten beiden Gruppen 16—20, und 21 und mehr D. sinkt die Kurve wieder ein wenig unter 90  $\frac{0}{0}$ . Daß die Kurve bei den allerhöchsten Graden wieder etwas fällt, darf wohl als Zufälligkeit aufgefaßt werden. Wir können also den Satz aufstellen, daß mit dem Wachsen der Myopie eine Zunahme der Komplikationen Hand in Hand geht.

Eine allgemeinstatistische Arbeit über Myopie wäre unvollständig, wenn nicht auch die Frage der Erbllichkeit erörtert würde. Wenn schon das Wesen der Vererbung bei anderen, einfach liegenden Verhältnissen aus dem Gebiete der Pathologie nicht genügend und unanfechtbar

geklärt ist, so gilt dies in doppeltem Maße von der Myopie, welche von den einen Autoren als eine Krankheit, als eine erworbene pathologische Eigenschaft, von anderen (Stilling) als eine durch den Bau der Orbita bedingte und durch Gebrauch verursachte Formveränderung des Auges aufgefaßt wird. Für die erste Auffassung dürfte die Vererbbarkeit der Myopie nicht vindiziert werden, da nach den jetzt geltenden Anschauungen nicht eine Krankheit, sondern eine zur Krankheit führende Disposition oder Anlage anatomischer Art vererbt werden kann.

Leider ist es mir nicht möglich, für die Hereditätsfrage einen Beitrag zu liefern, da in den Gießener Jahrbüchern diesbezügliche Angaben sich nur auf die subjektiv gefärbten Aussagen Myopiekranker über das Vorkommen von Kurzsichtigkeit in ihrer Familie gründen, die so unsicher und unzuverlässig sind, daß sie keinen Anspruch auf statistische Verwertung erheben können. Die anamnestischen Angaben, die ich vorfand, bezogen sich auf Myopie mittleren und hohen Grades. In der Mehrzahl der Fälle wurde eines der beiden Eltern oder die Großeltern als kurzsichtig bezeichnet, ferner Geschwister, Kinder und schließlich weitere Verwandte. Nur in wenigen Fällen konnten die Angaben eine objektive Bestätigung finden. Als bemerkenswert muß ich erwähnen, daß ich in Fällen hochgradiger Kurzsichtigkeit keine Hereditätsangabe fand, trotzdem gerade hierbei eine genaue Exploration der Anamnese in der Gießener Klinik erstrebt wurde. Hieraus darf man wohl den Schluß ziehen, daß für viele Fälle hochgradiger Myopie eine erbliche Belastung nicht nachzuweisen ist und vielleicht ganz ausgeschlossen werden kann. Daß sich anamnestische Angaben bei Kurzsichtigkeit niederen Grades, den sogenannten gutartigen Formen nicht fanden, ist, wie schon erwähnt, auf die Schwierigkeit und Unzulänglichkeit der Anamnesenerhebung zurückzuführen. Wir folgen auch der heute allgemein geltenden Auffassung, daß geringgradige

Kurzsichtigkeit in der Form der sogenannten Arbeits-Anpassungs-Kulturmyopie nicht den Gesetzen der Vererbung untersteht, sondern stets durch die gleichen Lebensverhältnisse, die gleichen Schädlichkeiten bei jedem Einzelindividuum neu ausgelöst wird. Daß für Vertreter gelehrter Stände, in denen oft durch Generationen hindurch ein und derselbe durch seine Naharbeit schädigende Beruf getrieben wird, eine gewisse vererbbare Disposition hinzutritt, ist wohl anzunehmen.

Über die Entwicklung der Myopie, ihre Progredienz oder ihr Stationärbleiben fand ich ebenfalls nur spärliche Aufzeichnungen in den Journalen, sodaß ich leider in dieser Hinsicht unser Material nicht verwerten kann. Wenn ich auch diesbezügliche Angaben in reichlicher Menge angetroffen hätte, so müßten sie doch mit großer Reserve aufgenommen werden wegen der Subjektivität der Anamnese. Fälle, wo durch mehrmalige ophthalmoskopische Untersuchungen Progredienz objektiv nachgewiesen werden kann, finden sich auch im Gießener Material, sind aber nicht in den Jahrbüchern derart bezeichnet, daß sie statistisch berücksichtigt werden konnten.

Ein Résumé des in der Statistik Auseinandergesetzten würde in kurzen Sätzen etwa folgendermaßen lauten :

1. Die Zahl der männlichen Kurzsichtigen war sowohl in absolutem wie in relativem Maße größer als die der weiblichen.

2. Im jugendlichen Alter bis zum 30. Lebensjahr kamen die meisten Kurzsichtigen zur Untersuchung und zwar beim männlichen Geschlechte in größerer Anzahl als beim weiblichen.

3. Im mittleren und hohen Alter fand sich die Kurzsichtigkeit relativ häufiger bei den Frauen.

4. Mit dem Wachsen des Kurzsichtigkeitsgrades nahm die Zahl der Myopen ab.

5. Kurzsichtigkeit unter 5 D. fand sich häufiger bei den Männern, Kurzsichtigkeit über 5 D. häufiger bei den Frauen.

6. Daß Naharbeit nicht ausschließlich als ursächlicher Faktor für die hochgradige Myopie anzusehen ist, beweist das Ergebnis, daß sich hochgradige Kurzsichtigkeit häufiger bei Nicht-Naharbeitern fand. Von leichtgradiger Kurzsichtigkeit waren die Naharbeiter bedeutend häufiger betroffen.

7. Das Staphylom darf als typische Myopiekomplikation betrachtet werden, da es in 27,99% aller Myopiefälle und 70,24% aller Komplikationen vorkam, während alle anderen Komplikationen in ganz bedeutend geringerer Anzahl sich fanden.

Abgesehen vom Strabismus convergens konnte von den in dieser Statistik berücksichtigten Komplikationen die Netzhautablösung, in 1,11% aller Myopiefälle, als die seltenste bezeichnet werden.

8. Die hochgradige Myopie war häufiger von Komplikationen begleitet, als die leichtgradige.

9. Im allgemeinen darf der Naharbeit kein Einfluß auf das Zustandekommen oder Fortschreiten von Komplikationen zugeschrieben werden, denn von den 652 Komplikationen fielen nur 225 auf Naharbeiter, während 427 sich bei Nicht-Naharbeitern fanden. Bei Myopie unter 10 D. kamen Komplikationen häufiger bei Naharbeitern, über 10 D. häufiger bei Nicht-Naharbeitern vor.

Ein Vergleich meiner Arbeit mit derjenigen Otte's zeigt, daß wir im wesentlichen zu denselben Resultaten gelangt sind. Die wenigen, nebenfächlichen Gegensätze, die sich in einigen Tabellen finden, sind nur zufälliger Natur und dürfen füglich außer Acht gelassen werden. Wir können aus der Übereinstimmung unserer Resultate wohl den Schluß ziehen, daß für die von uns beiden bearbeiteten Zeiträume die Art und Zusammensetzung des Gießener Myopiematerials die gleiche geblieben ist und daß daher

für ein derartiges Material die von uns aufgestellten Sätze absolute Gültigkeit beanspruchen dürfen.

Da das von mir bearbeitete Material sich immerhin nicht auf einen allzugroßen Zeitraum bezieht und sich bei einer relativ kleinen Anzahl von Fällen leicht Schwankungen in der Zusammenfassung einstellen, sei es mir noch gestattet, meine Resultate mit denjenigen Otte's zusammenzuziehen, um so mit Sicherheit einen Schluß über die Verhältnisse des Gesamtmyopiematerials der Gießener Klinik in den Jahren 1879–1905 inkl. bilden zu können. Um vielen Wiederholungen aus dem Wege zu gehen, will ich mich darauf beschränken, die Zahlenergebnisse des Gesamtmaterials nur nach den Hauptgesichtspunkten, wie sie in den obigen Schlußsätzen angegeben sind, hier anzuführen und zu kommentieren, während nebenfächliche statistische Anordnungen nicht wiedergegeben werden sollen.

Wir fassen also das Resultat des Gesamtmaterials in folgende Sätze zusammen:

1. Von den in den Jahren 1879–1905 inkl. in der Gießener Klinik behandelten Kurzsichtigen wurden 7351 Fälle statistisch verwertet und zwar:

5332 = 72,53 % männlichen Geschlechtes,

2019 = 27,47 % weiblichen Geschlechtes.

Es gehörten also weit über die Hälfte aller Myopen dem männlichen Geschlechte an.

2. Wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt, fallen weitaus die meisten Kurzsichtigen in die Jahresklassen

| Dioptrien                                          |                   | 1    | 2    | 3    | 4    | 5   | 6   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----|-----|
|                                                    | Nicht-Naharbeiter | 962  | 188  | 128  | 54   | 49  | 34  |
|                                                    | Naharbeiter       | 655  | 457  | 322  | 241  | 143 | 98  |
| % der sämtlichen<br>Nah- und Nicht-<br>Naharbeiter | Nicht-Naharbeiter | 58,2 | 11,4 | 7,7  | 3,3  | 2,9 | 2,1 |
|                                                    | Naharbeiter       | 30,6 | 21,3 | 15,0 | 11,2 | 6,7 | 4,6 |

15—20 und 21—30, und zwar beim männlichen Geschlechte in größerer Anzahl wie beim weiblichen, 3189 : 921.

| Alter  | 5—10 | 11—14 | 15—20 | 21—30 | 31—40 | 41 u. mehr |      |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| Männer | 152  | 504   | 1666  | 1523  | 604   | 883        | 5332 |
| Weiber | 114  | 223   | 448   | 473   | 295   | 466        | 2019 |
| Summe  | 266  | 727   | 2114  | 1996  | 899   | 1349       | 7351 |

3. Von allen Myopen hatten Kurzsichtigkeit unter 5 D. 6024 Personen = 81,95<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. Von diesen waren :

4522 = 75,07<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Männer,

1502 = 24,93<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Frauen.

Kurzsichtigkeit über 5 D. hatten 1327 Personen = 18,95<sup>0</sup>/<sub>100</sub>. Von diesen waren :

810 = 61,04<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Männer,

517 = 38,96<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Frauen.

Von den 5332 kurzsichtigen Männern waren 15,19<sup>0</sup>/<sub>100</sub>, von den 2019 kurzsichtigen Frauen 25,61<sup>0</sup>/<sub>100</sub> höhergradig (über 5 D.) myop.

Es war also hochgradige Myopie (über 5 D.) verhältnismäßig häufiger bei den Frauen, leichtgradige bedeutend häufiger bei den Männern zu finden, fast dreimal soviel wie bei den Frauen.

Von den sämtlichen männlichen Kurzsichtigen (Knaben unter 14 Jahren nicht einberechnet) waren 1653 = 22,48<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Nicht-Naharbeiter, 2142 = 29,13<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Naharbeiter. Wie sich das Verhältnis dieser beiden Gruppen für die einzelnen Dioptrien gestaltet, zeigt die Tabelle

| 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26 u. mehr |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|
| 32  | 25  | 25  | 24  | 15  | 20  | 10  | 17  | 20  | 11  | 18  | 8   | 3   | 2          | 1653 |
| 63  | 46  | 18  | 38  | 19  | 15  | 6   | 4   | 8   | 2   | 5   | 2   |     |            | 2142 |
| 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1        |      |
| 2,9 | 2,2 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |     |            |      |

Es sind also die Naharbeiter häufiger von Kurzsichtigkeit niederen Grades, die Nicht-Naharbeiter häufiger von Kurzsichtigkeit höheren Grades betroffen.

5. Von den Komplikationen der Myopie fand sich am häufigsten der Konus (resp. Staphyloma postikum), und zwar 1451 mal in 19,73<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Myopiefälle und 66,53<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Fälle mit Komplikationen.

Es folgen dann in einem großen Abstand Strabismus divergens 249 mal in 3,39<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Myopiefälle und 11,43<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Komplikationen.

Glaskörpertrübungen 243 mal in 3,31<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Myopiefälle und 11,14<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Komplikationen.

Chorioidealaffektionen 161 mal in 2,19<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Myopiefälle und 7,38<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Komplikationen.

Netzhautablösung 44 mal in 0,59<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Myopiefälle und 2,02<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Komplikationen.

Strabismus convergens 33 mal in 0,45<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Myopiefälle und 1,51<sup>0</sup>/<sub>0</sub> aller Komplikationen.

6. Die höheren Grade der Myopie waren häufiger als die niederen von Komplikationen begleitet, wie die folgende Zusammenstellung zeigt.

| Dioptrien                                                                   | 1—4   | 5—10 | 11—15  | 16—20 | 21 u. mehr |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-------|------------|
| Komplikations-Prozente sämtlicher Myopiefälle der einzelnen Dioptriegruppen | 19,27 | 51,9 | 104,51 | 85,8  | 90,3       |

7. Von den sämtlichen Kurzsichtigen waren 2181 = 29,67<sup>0</sup>/<sub>0</sub> mit Komplikationen behaftet, die wiederum in 1536 Fällen = 70,43<sup>0</sup>/<sub>0</sub> den Nicht-Naharbeitern und nur in 645 Fällen = 29,57<sup>0</sup>/<sub>0</sub> den Naharbeitern zufielen.

Bei Myopie bis zu 10 D. waren von Komplikationen befallen :

1144 Nicht-Naharbeiter,  
592 Naharbeiter.

Bei Kurzsichtigkeit über 10 D. waren von Komplikationen befallen:

392 Nicht-Naharbeiter,

53 Naharbeiter.

Allgemein gesprochen zeigte sich bei Myopie geringeren Grades Neigung zu Komplikationen häufiger bei den Naharbeitern, während im Gegensatz hierzu bei hochgradiger Kurzsichtigkeit mehr die Nicht-Naharbeiter von Komplikationen heimgesucht wurden.

Für die Überlassung des Materials der Gießener Augenklinik und die lebenswürdige Unterstützung bei der Anfertigung der Arbeit spreche ich Herrn Geh.-Rat Prof. Dr. Voffius meinen verbindlichsten Dank aus.

---


## Lebenslauf.

Ich, Heinrich Ankele, wurde am 2. November 1880 zu Steinberg bei Hann.-Münden geboren als Sohn des Kaufmannes Adolf Ankele. Ich besuchte zunächst die Bürgerschule zu Frankfurt a. M., sodann das städtische Goethe-Gymnasium daselbst, das ich Ostern 1901 nach bestandenen Maturitätsexamen verließ. Zuerst widmete ich mich während meines ersten Semesters dem Studium der Philologie zu Göttingen, um mich dann zu Anfang des zweiten Semesters der Medizin ebenfalls in Göttingen zuzuwenden, wo ich zur gleichen Zeit mein erstes halbes Jahr mit der Waffe bei dem 2. Kurheff. Inf.-Reg. Nr. 82 diente. Die nächsten 4 Semester verbrachte ich auf der Universität Marburg, wo ich im Frühjahr 1904 die ärztliche Vorprüfung bestand. Während des siebenten Semesters studierte ich in Berlin, während des achten in Marburg. Mein neuntes und zehntes Semester verbrachte ich in Gießen, wo ich im Mai 1906 die ärztliche Prüfung bestand.

---

# Curventafel I.


———— = Männer  
 - - - - - = Weiber





# Curventafel II.


----- Männer  
 ..... Weiber





# Curventafel III.

----- Naharbeiter  
 ————— Nicht Naharbeiter








----- Kältebatter

— nicht Kältebatter

Curventafel IV.



Curventafel V.

